

台東縣星期六為 「孳生源清除日」

請大家共同配合

阻絕登革熱！



登革熱
傳染途徑



埃及斑蚊
白線斑蚊



2



病媒蚊

病毒在斑蚊體內經過
8-12天的增殖

登革熱
主要症狀

發燒
頭痛
後眼窩痛
肌肉關節痛
出疹



登革熱病患

發病前 1 天至發病後 5 天
這段期間為「可感染期」。

1

斑蚊叮咬
登革熱病患

3

病媒蚊叮咬
健康者

4

健康者
感染登革熱

健康者

多數人感染初期補充
水分並多休息即可自
然痊癒。

如病患年紀大、有慢性病或重複
感染不同型登革病毒就可能引發
重症，最嚴重死亡率達 50%。

登革熱。防治撇步


● 預防登革熱最根本方法：**清除孳生源**

Q：何謂孳生源？

A：任何積水、病媒蚊能夠產卵衍生後代的容器

人工容器 > 飲料瓶、貯水桶、花盆底盤等。

天然容器 > 樹洞、竹筒、椰子殼、樹葉卷軸處等。



● 每週六或每週一次巡視家戶內外環境，落實：

巡

巡視家庭環境及
積水容器

倒

倒除容器積水
並倒置

清

清除不必要的
積水容器

刷

刷除容器上的
蚊卵

- 如出入登革熱流行縣市或國家，後續出現疑似登革熱症狀，應儘速就醫並主動告知醫護人員旅遊史及活動史。
- 如有登革熱確診個案足跡，應配合衛生單位進行家戶孳生源清除或化學防治（噴藥）措施。

疾管署登革熱
相關資訊

